

Acarose 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Acarose 降糖佳錠	Acarbose	50 mg/tab

【作用】

降血糖

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、一天服用三次，隨著主要三餐進食時間定時服用。

【注意事項】

- 1、若有對此藥或其他藥過敏請告訴醫師、藥師或其他醫護人員。
- 2、如果同時服用其他糖尿病藥物或是其他藥物，如：digoxin、diuretics、estrogens、isoniazid、高血壓藥、感冒藥、口服避孕藥、胰臟酵素、phenytoin、類固醇、甲狀腺素和維生素等，請告訴醫生。
- 3、如果您曾患有酮酸症、肝病、或腸方面的疾病，請告訴醫生。
- 4、服用本藥前，如有懷孕或準備懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 5、若您正準備要開刀(包括牙齒)，請告知您的(牙)醫師您正在服用此藥。
- 6、請務必聽從醫師或營養師所提供之運動或飲食建議，健康飲食是很重要的。
- 7、酒精類飲品會導致血糖降低，當您正在服用此藥時，請詢問您的醫師如何安全的飲用酒精飲料。

註：高血糖症狀：極度口渴、頻尿、極度飢餓、虛弱、視覺模糊。如有以上症狀請通知您的醫師。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症狀	如何處理
顫抖、頭暈或頭昏、冒汗、神經質或暴躁、心情或行為突然改變、頭疼、嘴角發麻或發疼、虛弱、皮膚蒼白、飢餓、行動笨拙或生澀。	補充葡萄糖製品或通知醫師。
意識混亂、抽搐、失去知覺。	血糖過低，請立即服藥
口乾、腸胃不適和嘔吐、呼吸急促、呼吸聞到水果味、意識不清。	高血糖引起酮酸症，立即通知您的醫師。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服。若接近要吃小點心的時間，請和小點心一起服用。如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍，置於兒童無法取得之處。當藥物過期或不再需要時，交給您的藥師做適當的處理。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)



財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)