

Acetaminophen 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Fucole PARAN 理冒伯樂 止痛錠	Acetaminophen	500 mg/tab
Antiphen 安佳熱 糖漿	Acetaminophen	24 mg/cc 60 cc/bot

【作用】

止痛、退燒

【用法和用量】

- 1、未經醫師指示切勿自行增加劑量，以免引起肝傷害。
- 2、12歲以下，一天不得服用超過五次。

【注意事項】

- 1、本藥對風濕性關節炎引起的紅腫沒有治療效果。
- 2、服用三天以上仍持續發燒，應再就醫診斷。
- 3、併用酒精將會引起嚴重的肝傷害。
- 4、肝功能不良者請小心使用。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
紅疹、蕁麻疹、過敏導致身體局部腫脹、嘶啞、呼吸或吞嚥困難	須告知醫師
噁心、嘔吐、沒有胃口、冒汗、極度疲倦、不尋常的出血，胃的右上方部位疼痛、眼睛或皮膚泛黃、感覺像感冒一樣	情況異常急迫應立即求救或送醫急救。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)