

## Actein 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	用法用量
Actein Effervescent 愛克痰 發泡錠	Acetylcysteine Effervescent	600 mg/tab	通常一日一至二次，一粒加入約 100 CC 冷開水溶解後服用。
Actein (粉) 愛克痰 顆粒	Acetylcysteine	100mg/pack	通常一日二至四次，以冷開水稀釋後服用。

### 【作用】

主要可減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性。

### 【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物
3. 如果您有或曾經有腎及肝臟，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。

### 【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情形：

症 狀	如何處理
噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、流鼻水、昏睡、輕微臭氣、腹瀉	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
發燒、皮膚發疹、搔癢、寒顫、呼吸困難、排尿困難	請立即就醫


### 【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)