

## Aspirin 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Bokey cap 伯基 腸溶微粒膠囊	Aspirin	100 mg/cap
Ropal “皇佳”熱痛寧錠	Aspirin	100mg/tab

### 【作用】

預防心肌梗塞、預防血栓性栓塞症、男性短暫性缺血性發作

### 【用法和用量】

1. 止痛：能夠緩解輕度至中度的疼痛，如肌痛、神經痛、頭痛。
2. 解熱：能夠緩解上升之體溫。
3. 消炎：如風濕痛、骨關節炎。
4. 可預防與心臟血管疾病有關的血栓塞併發症，如靜脈栓塞、腦缺血症。

### 【注意事項】

用藥前須知：

1. 服用本藥時，需以大量的開水沖服，以避免其在食道即溶化而造成不適。
2. 當服用此藥以後，出現紅疹、不尋常發燒、水腫、黑便、體重增加時，務必通知醫師或藥師
3. 當發現此藥有嚴重的醋酸味時，請勿服用。
4. 因為此藥會減少血小板的凝結，故開刀前請勿服用此藥。
5. 本身有胃腸疾病者，如胃潰瘍、胃炎、胃出血等，或嚴重貧血、蠶豆症者，需告訴醫師或藥師，因為需要避免使用此藥。
6. 此藥會影響尿酸的排除，故若有尿酸過高且正在服藥者，需告訴醫師或藥師。
7. 孕婦於懷孕的最後三個月，不可服用此藥，因為會延長懷孕及生產時間，並影響胎兒出生後血液肺循環。
8. 此藥不可自行給予發燒中的小孩服用，因有引起雷氏症的可能性，須經由醫師或藥師判斷。
9. 不同的症狀其緩解的時間亦有所不同，所以不要以為劑量不足或效果不佳，而自行調整服用的劑量或頻次。如風濕性關節炎的治療，並不是一天兩天的事，一般療程是兩星期，才能真正感覺症狀的舒緩。

## 【不良反應】

過量之副作用：喉頭或胃有灼熱痛感、嘔吐、排尿減少、發燒、不安、激動、多話且無意義、恐懼或神經質、頭暈、複視、無法控制的顫抖、混亂、異常激動的情緒、幻覺、發作、想睡、失去知覺。

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、嘔吐、胃痛、心灼熱	將情況告訴醫生
蕁麻疹、紅疹、過敏導致局部腫脹、呼吸困難、嘶啞、呼吸急促、濕冷的皮膚、耳鳴、聽力損失、嘔血、嘔吐物呈咖啡色、血便或黑便	立即通知醫生

## 【忘了服藥怎麼辦？】


當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

## 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)