

Acyclovir 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Virless 剋庖錠	Acyclovir	200 mg/tab
Aclovir 5g/支 艾剋樂芙 乳膏	Acyclovir	50mg/g
Devirus 力克 眼用軟膏	Acyclovir	4.5 g/支

【作用】

抗病毒。

【用法和用量】

- 1、每日使用 2 至 5 次，持續 5 到 10 天。
- 2、請遵照醫師指示服用，不可私自停藥增減藥量。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用下列其他藥物，應主動告知醫師討論使用方式：
amphotericin B；aminoglycoside antibiotics；cyclosporine；HIV 或愛滋病療程；pentamidine；probenecid；tacrolimus；vancomycin；阿斯匹靈和其它非類固醇抗發炎療程；磺胺藥。
- 3、若您曾患有腎臟疾病、HIV、愛滋病或免疫系統方面的問題時，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；嘔吐；腹瀉；頭暈；疲倦；激動；關節疼痛；掉頭髮；視覺改變。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
蕁麻疹；紅疹或水泡；發癢；呼吸或吞嚥困難；身體局部腫脹；嘶啞；心跳快速；虛弱；皮膚蒼白；難以入眠；感冒般的症狀；異常出血或瘀血；血尿；胃痛或胃抽搐；血便；排尿減少；頭疼；幻聽；混亂；侵略性的行為；講話困難；下肢發疼或發麻；突然無法控制身體的某些部位；產生無法控制的顫動；抽搐；失去知覺。	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：激動；抽搐；異常疲倦；失去知覺；四肢部份異常腫脹；排尿減少。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教慈善醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)