

Tonsaric 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Tonsaric 痛酸立克	Allopurinol	100 mg/tab

【作用】

治痛風、高尿酸血症。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用一至二次，最好飯後使用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您曾患有心臟衰竭、肝臟或腎臟方面的疾病，請告訴醫師。
- 3、醫師剛開始會給您較低的劑量，接著再逐漸增加，間隔不會多於一星期。
- 4、此藥在您充分感受到效用前，可能需要幾個月或更長的時間；最初幾個月，此藥會增加痛風發作的次數，縱使他最後是用來醫治。醫師或許會給予其他的療程防止最初的痛風發作，例如秋水仙素等。
- 5、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機具，包括車子。
- 6、酒精會減少此藥的效用，服藥期間請詢問醫師如何安全的使用酒精飲料。
- 7、每日至少喝八杯以上的水或其他液體，除非您的醫師有別的指示。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃、腹瀉、睏倦。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
皮疹；排尿痛苦；血尿；眼睛發炎；嘴唇或嘴腫脹；發燒、喉頭疼痛、冷顫和其它感冒的症狀；沒有胃口；體重異常下降；發癢。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。