

Aminophylline 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Aminophylline 氨基非林錠	Aminophylline	100 mg/粒	白色圓凸形-JCP,L23
Phyllocontin 菲康汀 持續錠	Aminophylline	225mg/tab	淡黃色圓凸形錠劑，SA 及橢圓內 NAPP 字樣

【作用】

氣喘及支氣管痙攣。

【用法和用量】

成人：一天三次，每次 1 或 2 粒。

小孩：依醫師指示服用

【注意事項】

1. 如有下列的情形，請提醒你的醫師：曾於過去使用此藥品或相關的藥品（如咖啡因）時，發生過不良反應者、懷孕、授乳、癲癇、甲狀腺機能異常、腎臟病、肝臟病、心血管疾病等情況或同時使用其他藥品者。
2. 使用此藥品期間，請避免大量飲用巧克力、可可、茶、咖啡及可樂等含咖啡因飲料。
3. 使用此藥品後若發生過敏現象，應立即停藥並告知你的醫師。
4. 使用此藥品須定期回診，尤其是在剛開始服藥的前幾個星期。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情況：

症 狀	如何處理
使用此藥品後若發生過敏現象，應立即停藥並告知你的醫師。	將情況告訴醫生


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

存放於乾燥的地方，避光，25°C 室溫以下保存，避免冷藏，避免放置孩童可及之處。切勿服用過期之產品。

若您仍有用藥問題，請詢問藥師

 財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410；05-6337333-2101

05-6337333 轉 2102（例假日及晚上）