

## Cordarone 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Cordarone 臟得樂 錠	Amiodarone	200 mg/粒

### 【作用】

心律不整。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日使用 1 至 2 次。

### 【注意事項】

- 1、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥或增減藥量。
- 2、若您有血壓方面的疾病，請告訴醫師。
- 3、若您懷孕或有其打算，請立即通知醫師，用藥期間不應該懷孕亦不可哺乳；停藥後一個月內，可能會有藥物殘留在體內，請和醫師討論您的生育計劃。
- 4、服用本藥前，如有開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 5、用藥期間應避免日曬(包括太陽燈)，否則會使您的皮膚受傷，如果有傷口會使其更加惡化。做好保護措施：穿著保護的衣服、太陽眼鏡、遮光劑，勿使用陽傘；即使停藥一陣子內亦不可曝曬於陽光下。
- 6、此藥可能會造成永久性的眼盲，視覺上若有任何異常，請告訴醫師。
- 7、停藥後幾個月內藥物仍會留於體內，其副作用會持續發生，請定時告訴您的主治醫師最近的身體健康情況。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
嘔吐；便秘；頭疼；性慾望減低；難以入眠或持續睡眠；臉潮紅；眼睛乾燥；嗅覺與味覺改變；唾液的產量改變。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；體重改變；心神不定；無法耐寒或耐熱；髮質脆弱；過度冒汗；經期不正常；甲狀腺腫大；視覺減弱或產生變化；眼睛對光敏感；眼睛疼痛；四肢部份腫脹；手無法控制的抖動；運動無法控制；肢體協調能力下降；四肢發麻、發痛；肌肉無力。	請立即就醫

註：用藥過量之副作用：心跳緩慢；反胃；視線模糊；頭昏；昏倒。

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密、避光容器內，放在室溫、乾燥、陰暗處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)