

Norvasc 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Norvasc 脈優	Amlodipine	5mg/tab

【作用】

用於控制高血壓、心絞痛。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、一天服用一次，每天固定時間服用。

【注意事項】

- 1、開始治療時醫師可能給低劑量，之後再慢慢增量。
- 2、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 3、服用本藥前，如有懷孕或其準備、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 4、患者如果有心臟衰竭或肝方面的疾病，請告知醫師。
- 5、您的醫生可能會交代低鈉(少鹽)高鉀的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。
- 6、不要和葡萄柚汁併服。每天要喝大量的水。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
四肢腫脹、頭疼、反胃、胃痛、頭暈或頭昏、嗜睡、虛弱、臉潮紅。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
更頻繁或更嚴重的胸痛；快速、沉重、或不規則的心跳；昏倒。	請立即就醫

註：藥物過量之副作用：頭暈、昏倒、心跳快速。請注意。


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)