

Curam 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Augmentin 安滅菌 膜衣錠	Amoxicillin 875 mg Clavulanate 125 mg	1 g/粒
Curam 諾快寧 懸液用粉劑	5ml 含 Amoxycillin 250mg/ Clavulanic acid 62.5mg /Aspartame 8.5mg,	312.5mg/5ml, 60 ml/bot

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。(粉劑請加冷開水至記號處，使用前請搖勻)
- 2、每日服用 2 次 (/12 hr) 至 3 次 (/8 hr)，和食物一起使用。

【注意事項】

- 1、療程結束前勿擅自停藥，突然停藥會使得細菌產生抗藥性。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、服用其他藥物 (Allopurinol、Probenecid) 或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您曾患有腎臟或肝臟病、過敏、哮喘、花粉症、蕁麻疹或單核白細胞增多症，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
腹瀉；反胃；嘔吐；輕微的紅疹。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重的紅疹；發癢；蕁麻疹；呼吸或吞嚥困難；喘息；陰道發癢和有分泌物；皮膚或眼睛泛黃。	請立即就醫

註：藥物過量副作用：胃痛；嘔吐；腹瀉；紅疹；過動；睏倦。


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

- ①加冷開水後，請保存在冰箱下層冷藏。
- ②未開封者請放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)