

Abilify 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Abilify 安立復錠	Aripiprazole	15 mg/tab

【作用】

精神分裂症，雙極性疾患之躁症發作及混合型發作

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、一天服用一次，每天固定時間服用。
- 3、可與食物服用或單獨不和食物併服。

【注意事項】

- 1、開始治療時醫師可能給低劑量，至少 2 星期後再慢慢增量。
- 2、服藥要超過 2 星期以上才能發揮最大效果。
- 3、感覺症狀改善後仍要繼續服藥，不要擅自停藥。
- 4、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、心臟病、服用其他藥物，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 5、不要和酒精性飲料併服。
- 6、操作具危險性機械包括開車應小心。
- 7、本品可能造成高血糖，尤其精神分裂症患者。
- 8、當身體變熱後，很難讓體溫下降變涼，激烈運動或處於極熱環境要小心。
- 9、不要和葡萄柚汁併服。每天要喝大量的水。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭疼、神經質、不易入睡、想睡、頭昏、不安、噁心、胃灼熱、便秘、胃痛、體重增加、口乾、沒有食慾、唾液分泌增加、關節痛	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
抽搐、減慢或增快的不規則心跳、手、腳、腳踝、下腿腫脹、視覺異常、身體或臉的運動無法控制、高燒、肌肉僵硬、混亂、冒汗、紅疹、搔癢、蕁麻疹、呼吸或吞嚥困難	請停藥，並立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)