

## Atenolol 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Tenormin 天諾敏錠	Atenolol	100 mg/tab
Ateol 壓平樂 膜衣錠	Atenolol	50 mg/fct

### 【作用】

高血壓、狹心症。

### 【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 使用持續釋放劑型時請整顆吞服，勿咀嚼或敲碎。

### 【注意事項】

- 1、突然停藥可能會造成胸痛、心臟病發作或是心律不整，醫師可能需要調配更大的劑量改善這些症狀，因此勿私自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 4、如果您曾患有哮喘或肺病、糖尿病、嚴重的過敏、甲狀腺機能亢進、嗜鉻細胞瘤、心臟衰竭、心跳緩慢、循環問題、心臟與腎臟疾病，請告訴醫生。
- 5、您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症狀	如何處理
頭暈、頭昏、疲倦、睏倦、消沉、反胃、腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸不足、四肢局部腫脹、體重異常上升、昏倒。	請立即就醫
服藥過量之副作用：力氣缺乏、呼吸困難、喘息、心跳緩慢、昏倒、四肢局部腫脹、體重異常上升、顫抖、頭暈、心跳迅速、冒汗或混亂、視線模糊、頭疼、嘴部發麻或發痛、虛弱、異常疲倦、臉色蒼白、突然飢餓。	請立即送急診

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)