

Imuran 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Imuran 移護寧	Azathioprine	50 mg/tab

【作用】

具有免疫調節作用，治療全身紅斑性狼瘡、重度風濕性關節炎、急慢性白血病等疾病，或作為腎臟移植手術防止排斥作用的輔助療法。

【用法和用量】

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 此藥需服用數星期至數月後療效才會顯著，故請勿任意自行停藥。
3. 若服用此藥後出現噁心的現象，可改在飯後服用以減輕此症狀。

【注意事項】

1. 此藥與某些藥品會互相影響，若您有服用下列藥品，請主動告知您的醫師：
抗凝血劑、降尿酸藥 Allopurinol、神經肌肉阻斷劑、ACEI 類降血壓藥、抗感染藥 co-trimoxazole、mercaptopurine 及其他骨髓抑制劑等。
2. 服用此藥期間請避免懷孕及哺乳。
3. 服用此藥需定期抽血檢驗血球數目是否正常，若您肝腎功能不佳，請主動告知您的醫師，以進行更嚴密的監測，減少副作用的產生。
4. 服用此藥期間禁止施打活菌疫苗。
5. 服藥期間應密切注意口腔、牙齦變化，定期清潔牙齒、按摩牙齦，若有異常應請教牙醫師。接受任何手術或拔牙前，請告知醫師或牙醫師正在服用本藥。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
輕微噁心嘔吐	
頭暈、發冷、發熱、肌肉疼痛、關節痛、肝功能異常、腹瀉、結腸炎、胰臟炎、心律不整、低血壓、貧血、瘀傷、出血、感染或骨髓抑制等症狀	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)