

Zithromax 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Zithromax 日舒錠	Azithromycin	250 mg/tab
Zithromax 日舒懸液用粉	Azithromycin	600 mg/15 cc/瓶

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

1、請遵照醫師指示服用，勿私自停藥或增減藥量。

2、錠劑:每日使用一次，與充足水份服用。

3、懸液用粉: 加 9 cc 冷開水，搖勻後再取出，加水後每瓶共有 15 毫升藥水，每 5 毫升含有 200 毫克的 Azithromycin。

小孩 > 45 kg : 500 mg 一天一次 服用 3 天或第一天 500 mg，然後每天一次 250 mg 於第 2-5 天。

小孩 < 45 kg : 10mg/kg/day 服用 3 天或第一天 10mg/kg/天，然後每天一次 5mg/kg 於第 2-5 天。

【注意事項】

1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、服用其他藥物（抗血凝劑；cyclosporine；digoxin；dihydroergotamine；ergotamine；抑制免疫系統的療程；nelfinavir；phenytoin；terfenadine）或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。

2、若您曾患有蕁狀纖維化、HIV、心率不整、腎臟或肝臟病，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；腹瀉；嘔吐；胃痛；輕微的皮疹。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重的皮疹；蕁麻疹；發癢；呼吸或吞嚥困難；身體局部腫脹；嘶啞；皮膚或眼睛泛黃；心跳迅速、沉重或不規則的。	請立即就醫


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)