

Narcaricin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Narcaricin 拿可欣 膠囊	Benzbromarone	50mg/cap

【作用】

此藥可促進尿中尿酸排泄，可改善痛風及高尿酸血症。

【用法和用量】

1. 請確實依照醫師指示服用，不可隨意改變服用劑量或任意停藥。
2. 每日使用一至兩次。

【注意事項】


1. 若您有肝、腎功能異常、腎結石等病史，或對本藥任何成分過敏，請主動告訴您的醫師或藥師。
2. 本藥於急性痛風發作時，暫不可使用。
3. 本藥具有顯著的尿酸降低作用，於使用初期可能誘發痛風。
4. 開始使用此藥前應先進行肝功能檢查，使用此藥期間，應定期進行肝功能檢查。
5. 服用此藥期間，請增加水分的攝取，以避免尿酸結石產生血尿、腎痛等症狀。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
胃腸不適、胃痛、腹瀉、胸部灼熱、噁心等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
食慾不振、全身倦怠、肝指數上升、皮膚或眼白部分變黃、皮膚起紅疹、搔癢等。	請立即就醫

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)