

Benzodiazepam 類用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	作用時間	主成份	含量
Ativan 安定文錠	短效	Lorazepam	0.5 mg/tab
Xanax 贊安諾錠	短效	Alprazolam	0.5 mg/tab
Lexotn 立舒定錠	中效	Bromazepam	1.5 mg/tab
Erispan-S 癒利舒盼錠	中效	Fludiazepam	0.25 mg/tab
ESZO 艾斯樂錠	中效	Estazolam	2 mg/tab
Modipanol 美得眠膜衣錠	中效	Flunitrazepam	1 mg /fct
Diazepam 煩靜錠	長效	Diazepam	2 mg/tab
Rivotril 利福全錠	長效	Clonazepam	0.5mg/tab
Rivotril 利福全2毫克錠	長效	Clonazepam	2 /tab
Frisium 服利寧錠	長效	Clobazam	10 mg/tab

【作用】

鎮靜、安眠、抗焦慮、抗痙攣、肌肉鬆弛

【注意事項】

用藥前須知：

Benzodiazepines 是一種可以改善你目前緊張、失眠症狀的製劑，它同時也具有鬆弛肌肉的作用。你目前所使用的劑量及用法是醫師根據你的病情所特殊設計的，請勿隨便更改服用劑量及拿藥給與你有類似病情的病人服用。若有任何有關藥物的問題，請就近請教你的醫師或藥師。

用藥須知：

- 1、服用本藥最重要的便是要完全遵照藥袋上的指示服用，絕對不要隨意增加服用劑量或增加服藥頻率及延長服藥的期限，以免造成成癮性。
- 2、服藥時應避免喝酒及操作機械。
- 3、停藥前應先經醫師診療，並漸次減少劑量至停藥為止。
- 4、過期藥品請隨即丟棄。

【不良反應】

副作用：嗜睡、頭暈、疲倦、虛弱、口乾、腹瀉、腸胃不適、胃口改變。

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
浮躁或激動、便秘、小便困難、頻尿、視覺模糊、性能力或行為改變	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
步行拖曳、持續、微小的震顫或無法靜坐、發燒、吞嚥或呼吸困難、嚴重皮疹、皮膚或眼睛泛黃、心跳不規則。	立即通知醫生


【忘了服藥怎麼辦？】

如果您每天服用數次但遺漏了一次，略過並按照原本的規定時間按時服藥。不要補服，不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥、避光處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)