Zcough 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Zcough 咳治得 軟膠囊	Benzonatate	100 mg/soft cap

【作用】

為止咳劑，可用於因感冒引起的咳嗽。

【用法和用量】

1. 通常成人每日三次，必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。
2. 直接吞服，請勿咀嚼，因主成分釋出會有短暫局部麻醉，而可能會有梗塞感。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥、局部麻醉劑或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是成藥或其它非處方用藥，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有腎及肝臟、多痰的咳嗽等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情形：

症　　狀	如何處理
胃部不適、噁心、便祕、鼻充血、頭暈、嗜睡等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
口、舌、咽感覺異常、皮膚搔癢、無知覺的胸痛、過敏、感覺寒冷、意識不清等。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102（例假日及晚上）