

Casodex 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Casodex 可蘇多錠	Bicalutamide	50 mg/tab

【作用】

強效的抗雄性素，由此抑制作用而造成攝護腺腫瘤的消退。
與LHRH類似劑療法或手術去勢療法併用於進展性攝護腺癌。

【用法和用量】

成人：一天一次，一次一粒，飯後服用。

【注意事項】

- 1、腎功能受損及輕度肝功能受損者不需調整劑量。
- 2、中~重度肝功能受損者應小心使用。
- 3、本品會抑制 CYP3A4，因此併用其他此類抑制藥如 cyclosporin、cimetidine、ketoconazole...應謹慎，避免本藥濃度升高而增加副作用與毒性。
- 4、孕婦、授乳婦不應使用此藥，以免危害胎兒。

【不良反應】

腎臟：血尿(12%)，夜尿 (12%)
呼吸：呼吸困難(13%)
皮膚：熱汗水 (Hot sweats, 53%)
胃腸：腹痛(11%)、便秘 (22%)、腹瀉(12%)、噁心(15%)。
免疫：感染性疾病(18%)
心臟血管：周邊水腫 (13%)、心肌梗塞 (2~<5%)、心衰竭(2~5%)。
骨骼肌肉：骨盆痛(21%)、背痛(25%)。
神經系統：無力(22%)
其它：疼痛 (35%)

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)