

Biperin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Biperin "聯邦" 帕金寧錠	Biperiden	2mg/tab

【作用】

帕金森氏症。

【用法和用量】

1. 通常一日三次至四次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是其他抗帕金森氏症用藥、meperidine、phenothiazines、精神病藥、抗憂鬱劑、抗心律不整藥、抗組織胺，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有腎及肝臟、前列腺肥大、腸胃道狹窄、癲癇、狹角性青光眼等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
口乾、精神激昂、視力模糊、眩暈、昏睡、便秘等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
運動困難、心跳變快、呼吸困難、神智不清等。	立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)