

Bisacodyl 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Dulcolax 樂可舒腸溶糖衣錠	Bisacodyl	5 mg/ect
Bisacodyl 無秘栓劑	Bisacodyl	10 mg/栓劑

【作用】

暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸

【用法和用量】

1. 錠劑為腸溶糖衣錠，需整顆吞服，勿咀嚼或敲碎。建議睡前服用，並喝適量液體，但勿與牛奶或制酸劑同時服用。服藥 6~8 小時後會引起腸子作用。
2. 栓劑應拆除外面鋁箔，由尖頭塞入肛門，必要時沾水（冷水）後再塞。利用手指將栓劑塞入直腸內，儘可能讓藥停留在那兒越久越好（能忍儘量忍）。使用完畢，記得洗手。通常塞後 30 分鐘內就會產生排便作用。若要使用半粒，請從頭至尾對切。

【注意事項】

- 1、不能每天長期使用，若每天需使用，必須檢查造成便秘的原因。
- 2、長期過度使用，可能造成反跳性的便秘。
- 3、使用栓劑可能會有疼痛及局部刺激，特別是肛門裂傷與潰瘍性直腸炎時。
- 4、服用其他藥品，及孕婦、授乳婦，請告訴醫生。
- 5、使用該類藥物可能發生腹部不適，包括絞痛與腹痛。曾有人發生腹瀉。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
胃痙攣、反胃、腹瀉、腸胃刺激、虛弱、栓劑可能會有灼熱及局部刺激。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)