

## Concor 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Concor 康肯錠	Bisoprolol	5mg/fct
Concor 康肯錠 1.25 公絲	Bisoprolol	1.25 mg/fct

### 【作用】

高血壓，狹心症，穩定型慢性中度至重度（NYHA class III、IV）心衰竭。可使心跳減慢，血管放鬆，所以心臟不必太用力做工。

### 【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用，勿私自停藥或增減藥量。
2. 每日使用一次，請於固定時間使用。

### 【注意事項】

- 1、醫師會給予一個較低的始用劑量，接著逐漸增加藥量。
- 2、此藥用於控制病情，但無法治癒；治療後需要幾星期的時間才感到有效。感覺情況有改善亦需持續用藥。
- 3、突然停藥可能會造成胸痛、心臟病發作或是心律不整，醫師可能需要調配更大的劑量改善這些症狀。
- 4、服用本藥前，如有哺乳、懷孕或準備懷孕、服用其他藥物（ $\beta$ -阻斷劑、Ca-阻斷劑、Rifampin、治心律不整藥）或曾患其他疾病（氣喘、肺、心、肝、腎、糖尿疾病、心跳緩慢、甲狀腺亢進、循環問題）或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 5、開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 6、服藥後可能會使您困倦，避免駕駛危險機具，包括車子。酒精會增加此效果，服藥期間請詢問醫師如何安全的使用酒精飲料。
- 7、您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
異常疲倦、嘔吐、腹瀉、肌肉疼痛、流鼻水。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸不足、四肢局部腫脹、體重異常上升、昏倒。	請立即就醫

註：服藥過量之副作用：四肢局部腫脹、體重異常上升、呼吸或吞嚥困難、眩暈、昏倒、顫抖、冒汗或混亂、視線、頭疼、嘴部發麻或發痛、虛弱、異常疲倦、臉色蒼白、突然飢餓。請急診治療。

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)