

Butin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Butin 伯汀錠	Bromocriptine	2.5 mg/tab

【作用】

巴金森症、抑制泌乳激素、精子過少引起之不育症、肢端肥大症。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用 1 至 2 次。

【注意事項】

1. 服用本藥前，如有懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
2. 您若有對特定藥物過敏或用此藥同時有服用下列其他藥物，請告訴醫師：紅黴素；Levodopa；高血壓用藥；偏頭痛用藥；口服避孕藥；鎮定劑；維生素。
3. 若您曾患有腎臟或肝臟病、心臟或循環方面疾病、精神疾病，請告訴醫師。
4. 此藥可能會使你疲倦，操作具危險性機械包括開車應小心。
5. 酒精飲料會增加藥物睏倦的副作用。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈；反胃；頭疼；疲勞；嘔吐；便秘。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
腳或腳腕腫脹；心跳快速、沉重或心律不整；困惑；流鼻水。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，避光儲存，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)