

Pulmicort 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Pulmicort Nasal Aqua 能舒鼻鼻腔定量噴液劑	Budesonide 1.28 mg/mL	64 ug/dose	棕色藥蓋 玻璃藥瓶

【作用】

此藥是內固醇，用來治療因過敏所引起的鼻塞及流鼻水。


【用法和用量】請按照醫師指示使用，劑量依個人需要調整。

1、治療鼻炎：成人及>6歲之兒童，建議的起始劑量為每天4壓，可在早晨1次給藥或在早、晚分成2次給藥使用。老年人使用劑量與成人相同。


2、治療鼻息肉：建議之劑量為每天4壓，此劑量可在每天早晨1次給藥，或在早、晚分成2次給藥使用。

(1) 將鼻子擤乾淨，搖晃瓶身，移除棕色保護蓋。

(2) 依圖示持住瓶子。



(3) 將瓶嘴插入鼻孔，並依醫師指示之劑量次數壓放。依同方式用鼻噴霧劑對另一鼻孔給藥。



(4) 蓋回棕色保護蓋，使用鼻噴劑時不要超過醫師指示之劑量次數。

【注意事項】

1、對於成份中任何一種成份過敏者，請告訴醫師。

2、若您有在服用處方藥或成藥，特別是過敏或氣喘之類的藥以及維他命，請告訴醫師。

3、告訴您的醫師如果您有結核病、皰疹、或未治療的疾病，請告訴醫師。

4、如果您未曾得過水痘、麻疹，也未曾注射這些預防針，應遠離這些人，如果與這些人接觸過，應告訴醫師，您可能需要去預防感染。

5、如果您是孕婦、哺乳婦或計畫要懷孕請先告訴醫師，若您在使用此藥期間懷孕，請通知醫師。

6、如果您將要動手術（包括牙科手術），請告訴醫師您正在使用此藥。

【不良反應】

症 狀	如何處理
鼻子發炎或發熱、鼻子出血或疼痛、胃消化不良、咳嗽、聲音嘶啞、嘴巴乾。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸困難、在口腔或嘴巴或鼻子出現白色斑點、月經異常、嚴重的粉刺出現、臉部腫大。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

跳過一次，不要補服，依正常時間用藥。不要服用加倍劑量。

【藥品如何保存】

請置於室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

