

## Symbicort 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Symbicort Turbuhaler/ 吸必擴都保定量粉狀吸入劑	Budesonide/ Formoterol	160 ug/ 4.5 ug	白色護蓋 紅色轉鈕


### 【作用】

此藥是類固醇，用來治療因過敏所引起的鼻塞及流鼻水。


### 【用法和用量】

本藥須由醫師處方使用

- 1、成人及18歲以上：每天2次，每次吸1-2劑。有些病患可能需要每天2次，每次多達4劑。
  - 2、青少年（12-17歲）：每天2次，每次吸入1-2劑。
  - 3、兒童（6歲及以上）：每天2次，每次吸入1劑。最大每日維持劑量為2劑。
  - 4、慢性阻塞性肺部疾病：成人每天2次，每次吸入2劑。
  - 5、老年人患者並不需要調整劑量。
- (1) 旋轉並移開瓶。當您旋轉打開瓶蓋時，會聽到格、格響聲。
- (2) 將吸入器之紅色轉鈕朝下，瓶子直立握住。當您旋轉轉鈕時，不要握住吸嘴。將轉鈕往一邊轉至最大程度，然後再往回轉至最大程度，以裝填一次劑量之藥物。先往那一邊轉都沒有關係，這時你會聽到喀嗒聲。



- (3) 將吸嘴輕置於您牙齒間，閉上嘴唇，用嘴巴用力深深吸氣，不要咬嚼吸嘴。
- (4) 呼氣。但不可經由吸嘴呼氣。



- (5) 在呼氣前，將吸入器由嘴巴移開。
- (6) 如果處方之劑量超過1次，請重覆步驟2-5步驟。
- (7) 蓋上旋轉蓋。

### 【注意事項】

- 1、對於成份中任何一種成份過敏者，請告訴醫師。
- 2、若您有在服用處方藥或成藥，特別是過敏或氣喘之類的藥以及維他命，請告訴醫師。
- 3、告訴您的醫師如果您有結核病、皰疹、或未治療的疾病，請告訴醫師。
- 4、如果您未曾得過水痘、麻疹，也未曾注射這些預防針，應遠離這些人，如果與這些人接觸過，應告訴醫師，您可能需要去預防感染。
- 5、如果您是孕婦、哺乳婦或計畫要懷孕請先告訴醫師，若您在使用此藥期間懷孕，請通知醫師。
- 6、如果您將要動手術（包括牙科手術），請告訴醫師您正在使用此藥。

### 【不良反應】

症 狀	如何處理
鼻子發炎或發熱、鼻子出血或疼痛、胃消化不良、咳嗽、聲音嘶啞、嘴巴乾。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
呼吸困難、在口腔或嘴巴或鼻子出現白色斑點、月經異常、嚴重的粉刺出現、臉部腫大。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

跳過一次，不要補服，依正常時間用藥。不要服用加倍劑量。

### 【藥品如何保存】

請置於室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。