

Miacalcic 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Miacalcic 密鈣息 針劑	Calcitonin	100 IU/cc/amp	透明安瓿 貼上英文藥名標籤

【作用】

高血鈣症、變形性骨炎、骨質疏鬆症、骨折

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示使用。
- 2、每日一次，固定時間使用。
- 3、操作方式：頭抬高並將噴管置於鼻孔內。按下泵浦使藥物釋放。
次日使用於另一個鼻孔。每瓶可供使用 14 劑。

【注意事項】

- 1、此藥用於預防及治療骨質疏鬆症，並無法治癒，因為若覺得情況好轉或改善請繼續用藥。詢問醫師前勿私自停藥或減少、增加藥的使用量。
- 2、用藥前記得閱讀使用說明書，並要求醫療相關人員指導，練習操作一次。
- 3、醫師可能會對您做皮膚測試，確定您是否會對此藥產生過敏反應。
- 4、告知醫師您是否同時有服用其他的藥物、維生素、營養食品或是中草藥。
- 5、若您有懷孕或其打算，請告知醫師。
- 6、使用此藥同時亦需攝取足量的鈣以及維生素 D。假使您無法從飲食中獲取應有的量，醫師也許會開處方為您補充這些重要的元素。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有


症 狀	如何處理
流鼻水、流鼻血、鼻竇疼痛、背部疼痛、關節痛、反胃、臉潮紅。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
蕁麻疹、皮疹、發癢、呼吸或吞嚥困難、舌頭或喉頭腫脹。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

藥品未打開前置於冰箱，但不可冷凍；開封使用後，直立儲於室溫即可，時常更換塑膠套子以保持噴管乾淨。使用 30 天後即需丟棄，請交給藥師或醫療相關人員做適當的處理。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)