Ceporin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Ceporin 血樂平 錠劑	Captopril	25 mg/tab

【作用】

降血壓、充血性心衰竭、糖尿病腎病變。

【注意事項】

1. 此藥用於控制病情，無法治癒；若感覺症狀改善請繼續用藥，切勿擅自停藥或增減藥量。
2. 懷孕或哺乳不可服用此藥，用藥期間若想懷孕或懷孕，應立即告訴醫師。
3. 服用本藥前，如有服用其他藥物（利尿劑、鋰鹽、其他高血壓劑、鉀補充劑）或曾患其他疾病（心臟、腎臟病、糖尿病）或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
4. 開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
5. 您的醫師若有規劃低鹽、低鈉的飲食計劃，請遵從醫師的指示執行。
6. 本品有輕微的硫磺味。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症　　狀	如何處理
頭暈或頭昏；味覺受損或異變（鹹味或金屬味）；咳嗽；喉嚨疼痛；發燒；嘴痛；異常瘀血；心跳快速；異常疲倦。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
胸痛；身體某些局部腫脹；呼吸或吞嚥困難；昏倒；紅疹。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102（例假日及晚上）