

Carbamazepine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Tegretol 癲通錠	Carbamazepine	200 mg/tab
Tegretol CR-FCT 癲通 長效膜衣錠	Carbamazepine	200 mg/粒

【作用】

癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經

【用法和用量】

- 1、持續釋放劑型每日兩次，其餘劑型每日 2~4 次。
- 2、持續釋放劑型使用時需整粒吞服，不可剝半、咀嚼或敲碎。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或其準備、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物、營養食品、中草藥或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、持續釋放劑型之藥物經由外殼上的小洞持續釋出，外殼不溶於腸內，隨排瀉物排出體外，藥品於糞便中為正常現象，請放心。
- 3、醫師於開始會給予較小的劑量，再逐漸增加；感覺情況已有改善亦勿擅自停藥，如因此病情惡化，您的醫師也許會以更大的劑量來控制您的病情。
- 4、如果您在服用單胺氧化酶抑制劑 (Monoamine Oxidase Inhibitors, MAOIs) 或是停藥未滿兩星期，不可服用本藥。
- 5、您若曾患有青光眼、精神疾病、或心臟、肝、腎及甲狀腺方面的疾病，請告知醫師。
- 6、此藥可能會減少荷爾蒙避孕的效率，若用藥期間陰道異常出血或懷疑自己可能懷孕了，請通知醫師；使用此藥時不可哺乳。
- 7、此藥會讓你疲倦想睡，服藥時盡量別駕駛危險機械，包含車子。
- 8、酒精飲料會增加藥物副作用，請小心。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
困倦、頭暈、搖晃、反胃、嘔吐、頭疼、憂慮、意識混亂、腹瀉、便秘、胃灼熱、口乾、背痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹、困惑、產生幻覺、意氣消沈、有自殘傾向、胸痛、皮膚或眼睛泛黃、視覺問題。	請立即就醫

註：藥物過量產生的副作用：神志不清、發作、心神不定、肌肉抽搐、異常行為、身體發生無法控制的震動、不穩定、困倦、頭暈、視線模糊、呼吸不規則或緩慢、心跳迅速或猛烈、反胃、嘔吐、小便困難。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)