

## Carbizo 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Carbizo 抗泌腫錠 10 公絲	Carbimazole	10 mg/tab	黃色 圓扁型 錠劑 3 個 U 字樣

### 【作用】

甲狀腺機能亢進，甲狀腺中毒症，白色陀氏病，甲狀腺手術前治療基礎新陳代謝過高。

### 【用法和用量】

- 1、甲狀腺切除前或放射性碘治療前通常先以本品治療。
- 2、一天服用三次，因為會反胃，通常與食物併服。

### 【注意事項】

- 1、如果您對該藥過敏，請告訴醫師或藥師。
- 2、與其他藥併服如：warfarin、乙型阻斷劑、糖尿病藥、theophylline、digoxin，應告訴醫師。
- 3、如果您曾經罹患血液疾病（白血球、血小板減少，再生不良性貧血）或肝疾病，請告訴醫師。
- 4、打算懷孕、已懷孕、哺乳，應告訴醫師。本品可能會傷害胎兒。
- 5、如果您有手術，包括牙齒手術，告訴醫生或牙醫您在服用 methimazole。
- 6、不要擅自增減藥量或停藥。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
皮疹搔癢、異常掉髮、反胃、嘔吐、味覺喪失、感覺異常（刺痛、灼熱感、緊繃和拉扯）、腫脹、關節和肌肉痛、昏睡、眩暈、白血球和血小板降低。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
喉嚨疼痛、發燒、頭痛、寒顫、異常的出血或瘀血、右腹部疼痛伴隨食慾降低、皮膚或眼睛泛黃、皮疹。	請停藥，並立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。



財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)