

Syntrend 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Syntrend 心全錠	Carvedilol	25 mg/tab	白色圓扁型錠劑， SYNTREND / S,Y 字樣

【作用】

降血壓、心絞痛、鬱血性心衰竭。

【用法和用量】

1. 醫師會給較低的起始劑量，然後逐漸增加藥量，請遵照指示服用。
2. 每日兩次，與食物一併使用。
3. 使用持續釋放劑型時請整顆吞服，勿咀嚼或敲碎，每日一次與早餐併服。

【注意事項】

- 1、此藥控制病症但無法治癒，病情好轉請持續服藥不可私自停藥或增減藥量。
- 2、突然停藥可能會造成胸痛、心臟病發作或是心律不整，醫師可能需要調配更大的劑量改善這些症狀，因此勿私自停藥。
- 3、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 4、開刀前(包括牙齒)應告訴醫師您正在服用此藥。
- 5、如果您曾患有哮喘或肺病、糖尿病、嚴重的過敏、甲狀腺機能亢進、嗜絡細胞瘤、心臟衰竭、心跳緩慢、循環問題、心臟與腎臟疾病，請告訴醫生。
- 6、服藥後可能會使您睏倦，避免駕駛危險機器，包括車子。
- 7、使用持續釋放劑型前後2小時內，勿使用其他藥物或飲用酒精類飲料。如有衝突，請告訴醫師聽其指示。
- 8、當您第一次使用此藥或增加藥量，還是已停藥數日重新接受療程時必須瞭解的情況：橫臥突然爬起會有頭暈、頭昏、或昏倒的狀況。避免發生危險，您應慢慢下床，於床邊休息一會再緩緩站起。症狀沒改善請告訴醫師。
- 9、若您配帶隱形眼鏡覺得眼球異常乾燥，請向醫師反應。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
疲倦；虛弱；頭昏；頭暈；頭疼；腹瀉；噁心；嘔吐；視覺改變；關節痛；難以睡著會清醒；咳嗽；眼睛乾燥；手腳發麻、燙、痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
昏倒；呼吸不足；體重上升；四肢部份腫脹；胸痛；心跳緩慢不規則；紅疹；蕁麻疹；發癢；呼吸和吞嚥困難。	請立即就醫

註：此藥可能會導致**高血糖**，若出現下列症狀請盡快就醫：異常口渴、頻尿、異常飢餓、虛弱、視覺模糊。**服藥過量**之副作用：可能會心跳緩慢、頭暈、昏倒、呼吸困難、嘔吐、失去知覺、發作。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。



財團法人天主教若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410(白天)

05-6337333 轉 2102(例假日及晚上)