

Ceflour 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Ceflour 喜華 膜衣錠	Cefuroxime	250 mg/tab	白色 長圓柱形錠劑 有 YSP39 標記

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，勿私自停藥或增減藥量。
- 2、一般療程每日2次持續約7到10天，需整粒與充足水份服用，不可咀嚼或敲碎，無法吞服請告知醫師，可用懸浮液代替。

【注意事項】

- 1、療程結束前勿擅自停藥，突然停藥會使得細菌產生抗藥性。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算 哺乳 服用其他藥物（抗凝血劑、利尿藥、胃潰瘍用藥、其它抗生素、probenecid）或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您曾患有結腸炎，腎臟、肝臟或胃方面的疾病，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；腹瀉；嘔吐；胃痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重皮疹；發癢；蕁麻疹；呼吸或吞嚥困難；喘息；濕疹；嘴部或喉嚨疼痛；陰道發癢有分泌物。	請立即就醫

註：藥物過量副作用：抽搐。

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。