

Celebrex 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Celebrex 希樂葆膠囊 200 公絲	Celecoxib	200 mg/cap	白色 膠囊 7767 200 黃線

【作用】

緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，減少家族性腺瘤息肉症（FAP）病患之息肉數目，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。

【用法和用量】

通常成人每次 1 錠，一天 1~2 次飯後服用。

【注意事項】

- 1、如果您對該藥或磺胺藥過敏，請告訴醫師或藥師。
- 2、如果您在服用心律不整藥、ACE I、提升情緒的抗憂鬱劑及其他藥物，請告訴醫師，可能需改變劑量或監測副作用。
- 3、打算懷孕、已懷孕、哺乳，應告訴醫師。
- 4、如果要開刀（包括牙齒）、需要長期服藥，您或您的家人曾經患有心血管疾病、高血壓、糖尿病、高血脂，請告訴醫師。
- 5、如果您大量喝酒或併服其他藥品如抗凝血劑、消炎止痛劑、口服類固醇、曾經胃腸出血、經歷胃痛、心頭灼熱、嘔吐物帶血或咖啡狀、血便或黑便，也要告訴醫師。
- 6、如果您胸痛、呼吸短促、身體一邊或部份無力、言詞含糊，請儘速就醫。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
喉嚨痛、腹瀉、感冒症狀、脹氣	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
無法解釋的體重增加、反胃、過度疲勞、不尋常出血或瘀血、搔癢、無力、食慾喪失、胃右上方痛、皮膚或眼睛泛黃、感冒症狀、起水泡、發燒、紅疹、蕁麻疹、搔癢、臉、喉嚨、嘴唇、舌頭、眼睛、手、腳、腳踝、下腿腫脹、呼吸或吞嚥困難、皮膚蒼白、喉嚨嘶啞、背痛、尿液混濁、血尿、排尿困難、頻尿，尤其晚上。	請停藥，並立即就醫
無力、昏睡、反胃、嘔吐、胃痛、嘔吐物帶血或咖啡狀、血便或黑便、意識喪失、蕁麻疹、皮疹、臉、喉嚨、嘴唇、舌頭、眼睛、手、腳、腳踝、下腿腫脹、呼吸或吞嚥困難。	過量的症狀，應立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。