

Cephalexin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Cephalexin 賜福力欣膠囊	Cephalexin	500 mg/cap
Ulexin 優力黴素口服懸液用顆粒	Cephalexin	25mg/cc, 60cc/bot

【作用】

抗菌劑。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，勿私自停藥或增減藥量。
- 2、每日 2 至 3 次持續約 7 到 10 天，需整粒和充足水份服用；與食物或牛奶併服避免有反胃的感覺。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物(抗生素、抗凝血劑和維生素)或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您曾患有結腸炎，腎臟、肝臟或胃方面的疾病，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有


症 狀	如何處理
反胃；腹瀉；嘔吐；輕微的皮疹。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
嚴重的皮疹；發癢；蕁麻疹；呼吸或吞嚥困難；喘息；異常的出血或瘀血；喉嚨疼痛；嘴部或喉嚨痛苦；陰道感染。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

財團法人天主教若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)