

Chlorpheniramine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Chlorpheniramine 氯芬尼拉明 錠	Chlorpheniramine	4 mg/tab

【作用】

抗過敏。

【用法和用量】

1. 每 4 至 6 小時服用一次。
2. 請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、若您有對藥物過敏或服用以下其他藥物，請主動告訴您的醫師：
MAO_inhibitor；Tranlycypromine；感冒藥；花粉症用藥；抗過敏藥；肌肉鬆弛劑；麻醉劑；鎮靜劑；安眠藥；鎮定藥；維生素。
- 3、如果您曾患有哮喘；青光眼；潰瘍；糖尿病；小便困難；心臟病；高血壓；抽搐；甲狀腺機能亢進，請告訴醫生。
- 4、開刀前（包括牙齒）應告訴醫師您在服用此藥。
- 5、用藥後可能會使您感覺疲倦，別駕駛危險機具或交通工具以保安全。
- 6、酒精飲品會使您有睏倦感，請小心。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
口腔、呼吸道感覺乾燥；反胃；頭疼；胸口壅塞；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
視覺障礙；小便困難；呼吸困難；肌肉無力；長時期想睡覺；興奮(特別是對於兒童)；頭暈；皮疹。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。