

Soma 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Soma 舒肌痛 膠囊	Chlorzoxazone Acetaminophen Caffeine anhydrous Thiamine Disulfide	150 mg 250 mg 20 mg 7.7 mg

【作用】

肌肉鬆弛、止痛。

【用法和用量】

1. 每天服用約三到四次，一般建議空腹或飯後服用。
2. 服用本藥期間，請勿飲用酒精性飲料。

【注意事項】

1. 用藥品前，如果您正在服用單胺氧化酶抑制劑、抗憂鬱藥、安眠藥、止痛藥物、感冒或過敏藥物及其他肌肉放鬆藥物，請先告知您的醫師。
2. 有肝臟、腎臟相關疾病病史或青光眼患者，服藥前，請先告知您的醫師。
3. 您計畫懷孕或可能懷孕或哺乳，請先告知您的醫師。
4. 可能會引起思睡及注意力下降，故服藥期間，如果從事需要注意力的工作，如：操作機械、開車...等，須特別小心。
5. 用藥後，有時尿液會變為橙色，此為藥物代謝產物的緣故，毋須擔心。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
思睡、睏倦、暈眩、蹣跚、便秘、腹瀉、噁心 嘔吐、口乾、胃部不適。	如果這些症狀嚴重或一直 持續，請告訴醫師
皮疹、皮膚搔癢、呼吸困難、臉或舌頭腫脹、 眼睛或皮膚發黃、肌肉無力、語言困難。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)