

Choles 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Choles 可利舒 粉劑	Cholestyramine	9g (含主成份 4g) / 包

【作用】

止瀉、降血脂

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日服用二至四次。
- 3、藥粉不可單獨服用，其使用方式為：
 - 一、將藥粉和入大量的開水、牛奶、果汁、湯或是其他的飲料。
 - 二、慢慢的將混合液喝掉。
 - 三、再用大量的飲料沖洗杯子並且喝掉，確認所有的藥粉都有服用到。
 - 四、藥粉雖然可以和熱湯混合，但千萬不可加熱。
- 4、使用此藥需服用大量的液體。

【注意事項】

- 1、服藥時間最好於用餐或睡覺之前，如有使用其他藥品，應於服用本藥前一小時或服藥後四小時使用，因為此藥會影響其他藥品的吸收。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或其準備、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，勿擅自停藥或增減藥物的使用量。
- 3、如果您曾患有心臟病、心絞痛、苯酮尿症或是胃、腸、膽囊方面的疾病，請告知您的醫師。
- 4、飲食以低膽固醇、低脂肪為主。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症狀	如何處理
便秘、脹氣、胃痛、排氣、腸胃不適、嘔吐、腹瀉、失去胃口、胃灼熱、消化不良。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
異常出血（例如從直腸或排氣時出血）。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)