

Pletaal 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Pletaal 普達錠	Cilostazol	50mg/tab

【作用】

緩解間歇性跛足的症狀。

【用法和用量】

1. 通常一天二次，飯前服用。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是 Aspirin、Warfarin、Omeprazole、Erythromycin、Diltiazem、Quinidine、Lovastatin，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有肝臟、鬱血性心衰竭等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。
6. 服用此藥應避免和葡萄柚汁併用。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭痛、排便異常、呼吸道感染、四肢水腫、心悸、眩暈、消化不良、噁心、背痛、肌痛等	將情況告訴醫生
出血、心律不整、蕁麻疹等	立即通知醫生

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)