

Lindacin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Lindacin 利達信黴素膠囊	Clindamycin	150 mg/cap

【作用】

消炎殺菌。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，勿私自停藥或增減藥量。
- 2、每日使用 4 次（每六小時一次）。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、如有對藥物過敏或服用其他藥物，應主動告知醫師。
- 3、若您曾患有食道、肝臟或腎臟方面疾病，請告訴醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；嘔吐；脹氣；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
結腸炎；嚴重持續的腹瀉；嚴重的胃痙攣；血便； 皮疹。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)