

## Clomid 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Clomid 快樂妊錠	Clomiphene	50 mg/tab

### 【作用】

男、女性腺機能不全。刺激女性排卵，偶爾也可用來治療男性不孕、月經不正常、乳房纖維囊腫、持續乳汁分泌。

### 【用法和用量】

通常在月經週期來後第 5 天開始服用，一天 1 次，每次 1 粒，連續服用 5 天。

### 【注意事項】

- 1、如果您對該藥過敏，請告訴醫師或藥師。
- 4、打算懷孕、已懷孕、哺乳，請告訴醫師。
- 5、曾患有卵巢囊腫、子宮纖維瘤、腦下垂體瘤、不正常陰道出血、甲狀腺或腎上腺、肝臟疾病、不正常的乳房攝影，請告訴醫師。
- 6、可能引起複視，應小心開車或操作機械，尤其光線不良時。
- 7、本品會引起多胞胎。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
熱潮紅、乳房疼痛或壓痛、反胃、嘔吐、不正常陰道出血、頭痛。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
視力模糊，複視、有閃點或盲點、胃壓痛或腫脹、體重上升、呼吸短促	請停藥，並立即就醫
急性過量可能造成反胃、嘔吐、熱潮紅、複視、有閃點或盲點、胃腫脹、胃痛。	請急診

### 【忘了服藥怎麼辦？】

忘了服藥，應在想起後儘快補服，如果接近下次時間，打電話問醫師，不要補服。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處（不要放在浴室），不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)