

Codeine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Codeine 磷酸可待因錠	Codeine.PO4	30 mg/tab

【作用】

鎮咳、止痛。

【用法和用量】

1. 通常每 4-6 小時服用一次。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，特別是其他疼痛緩解劑、鎮靜安眠劑、止痛消炎藥、肌肉鬆弛劑、抗凝血劑、抗焦慮劑、精神科用藥或感冒藥等，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有藥物依賴病史、酒精中毒、腎臟、肝臟、氣喘、發炎性腸胃道疾患，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫師，您正服用本藥。
6. 本藥有時會有嗜睡、眩暈的副作用，由平躺的姿勢改為直立時，請緩慢移動，以免血壓明顯下降。
7. 服藥期間請避免開車或操作機械。
8. 酒精會加重嗜睡的副作用，請避免飲酒。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有以下情形：

症 狀	如何處理
胃部不適、嘔吐、皮疹、發汗、眩暈、昏睡、便秘、 排尿障礙、顏面潮紅等。	如果這些症狀嚴重或一 直持續，請告訴醫師
呼吸困難、情緒改變。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)