

## Colchicin 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Colchicin 可樂喜定 錠	Colchicin	0.5 mg/tab

### 【作用】

可解除痛風或痛風性關節炎的腫脹和疼痛，也可常規服用，預防其發作。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、若您用本藥治療痛風引起的疼痛，於感覺痛時應立即使用，通常 12 小時內會開始解除痛苦，36 至 72 小時症狀會消失。

### 【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳、服用其他藥物（特別是會影響維生素 B<sub>12</sub> 的吸收）或對藥物過敏，應告訴醫師。
- 2、若您曾患有腸、胃、血液、心臟、肝臟或腎臟方面的疾病，請告訴醫師。
- 3、尿液檢查時應告訴醫師或檢驗人員您正在服用此藥，秋水仙素可能會影響檢驗結果。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃、嘔吐、腹瀉、發燒、嚴重的紅疹、呼吸困難、發作、異常出血或瘀血、血尿或血便。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)