

Endoxan 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Endoxan 癌德星 錠	Cyclophosphamide	50 mg/tab

【作用】

抗腫瘤

【用法和用量】

請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、如果對藥物過敏，或同時在服用其他藥物，特別是阿斯匹靈或維他命，請告知醫師。
- 2、若患者本身有腎臟方面的疾病，請告知醫師。
- 3、本藥可能會影響女性月經的正常週期以及停止男性精子的生產。然而您不能因為如此就認定自己無法懷孕或令人受孕。女性患者若有懷孕或是哺乳，請在用藥前跟醫師說明，本藥也許會對胎兒造成傷害。
- 4、服藥期間請喝大量的液體，因為藥物會使您的腎臟以及膀胱發炎，如果您在進行化療，這是特別重要的預防措施。
- 5、未經醫師同意前，勿施打任何牛痘。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
髮質變得輕薄易碎、皮膚暗沉、皮膚起水泡或粉刺、胃口或體重下降。	
嘴起水泡、疲勞。	如果症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
痛苦的排尿或紅色尿、黑色或柏油色的糞便、異常受傷或流血、咳嗽、充血、熱病、頭暈、冷顫、呼吸不足、喉頭疼痛、腳或腳踝腫脹、噁心嘔吐、紅疹。	請立即就醫

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)