

Cyproheptadine 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Cytadine 喜達鎮錠	Cyproheptadine	4 mg/tab
Cypromin 希普利敏液	Cyproheptadine	0.4mg/cc, 120cc/bot

【作用】

抗過敏。

【用法和用量】

1. 每日服用 2 至 3 次。
2. 請遵照醫師指示服用。

【注意事項】

- 1、服用本藥前，如有懷孕、哺乳，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 2、開刀前（包括牙齒）應告訴醫師您在服用此藥。
- 3、若您有對藥物過敏或服用下列其他藥物，請主動告訴您的醫師：精神用藥；肌肉鬆弛劑；麻醉藥；安眠藥；鎮定藥；維生素；其他的抗過敏或感冒藥。
- 4、兩星期內若有服用 MAO 抑制劑 或 tranylcypromine，請勿服用本藥。
- 5、如果您曾患有哮喘、糖尿病、青光眼、潰瘍、小便困難(攝護腺腫大)、心臟病、高血壓、抽搐或甲狀腺機能亢進，請告訴醫生。
- 6、用藥後可能會使您感覺疲倦，別駕駛危險機具或交通工具以保安全。
- 7、酒精飲品會增加藥物使用後的睏倦感，請小心。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
呼吸道乾燥；睏倦；頭暈；反胃；胸悶；頭疼；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
興奮(特別是對於兒童)；肌肉無力；小便困難；視覺障礙；皮疹。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)