

口服糖尿病藥物(DPP4 抑制劑)用藥指導

(Dipeptidyl Peptidase 4)

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Galvus 高糖優適錠	Vildagliptin	50mg/tab
Januvia 佳糖維	Sitagliptin	100 mg/fct
Trajenta 糖漸平 膜衣錠	Linagliptin	5 mg/tab

【作用】

降血糖，治療第 2 型糖尿病。

【用法和用量】

- 1、成人：一天 1-2 次，一次一粒。飯前或與食物並服均可。
- 2、兒童：安全性尚未建立。

【注意事項】

- 1、如果您對本藥或任何其他藥物過敏，請告訴您的醫生或藥師。
- 2、告訴您的醫生和藥師你正在服用或計劃服用其他處方藥和非處方藥，如：維生素、營養補充劑和草藥。要注意以下藥物：Tegretol、Insulin、其他口服降血糖藥、Dilantin、Phenobarbital、Rifabutin、Rifampin、Ritonavir (Kaletra)，你的醫生可能需要改變你的藥物劑量或仔細監視你的副作用，尤其是聖約翰草 (St. John's wort)。
- 3、如果您有接受任何手術或急救治療 (包括牙齒)，請告知醫師。
- 4、如果你是孕婦，計劃懷孕或正在哺乳，請告訴您的醫生。
- 5、若有血糖過低症狀，趕緊先吃含糖的食物 (如柳橙汁、蜂蜜、砂糖、糖果)

註：高血糖症狀：1、極度口渴 2、極度饑餓 3、頻尿 4、視力模糊 5、虛弱
若發生呼吸急促、反胃、嘔吐、意識降低，請立即就醫。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
關節、背部或肌肉疼痛；頭痛	任何這些症狀如果嚴重或不消失，請告訴您的醫生。
皮疹、蕁麻疹；腫脹的臉、嘴唇、舌頭或咽喉；呼吸或吞嚥困難；聲音嘶啞；持續性疼痛，開始在左上角或中間的胃，但可能會蔓延到背部；噁心；嘔吐；食慾不振	請家屬或朋友送至醫院治療


【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，室溫、避光、避熱、防潮，且不容易被小孩拿到的地方。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：
05-6335410 (白天)
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)