

Pradaxa 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Pradaxa 普栓達 膠囊	Dabigatran	110mg/cap

【作用】

防止血栓形成，以降低中風、心肌梗塞、或周邊動脈栓塞事件的發生。

【用法和用量】

1. 通常每天兩次，每次一錠。
2. 必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
3. 如果您有或曾經有腎臟、肝臟、出血等疾病，應告知您的醫師。
4. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
5. 如果您計劃手術，包括牙科手術，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用本藥。
6. 服藥期間儘量避免受傷，包括刷牙、修剪指甲等。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
皮膚發疹、眼臉腫脹、呼吸困難、血尿、血便或黑便、胸痛、呼吸短促、咳血、經常流鼻血、下肢疼痛、異常出血或瘀傷	立即通知醫生

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院
諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)