

Ziefmycin 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Ziefmycin 奇福R 黴素 膠囊	Dicloxacillin	250mg/cap

【作用】

抗菌劑

【用法和用量】

1. 請遵照醫師指示服用。
2. 六小時服用一次，每日4次，空腹（飯前一小時或飯後二小時）服用。

【注意事項】

1. 療程結束前勿擅自停藥，突然停藥會使得細菌產生抗藥性。
2. 服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物(抗生素、Allopurinol、抗凝血劑、Atenolol、口服避孕藥、Probenecid、Rifampin、Sulfasalazine、維生素)或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
3. 若您曾患有哮喘、花粉症、腎臟或食道疾病(特別是結腸炎)，請告訴醫生。

【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；腹瀉。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
紅疹；發癢；發燒；冷顫；臉部腫脹；喘息；呼吸困難；異常的出血或瘀血；頭暈；抽搐；嘴或喉嚨疼痛。	請立即就醫

註：藥物過量副作用：胃痛；嘔吐；腹瀉；紅疹；過動；睏倦。

【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。