

## Elistin 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Elistin 益利循錠	Dihydroergotoxine	1.5 mg/tab

### 【作用】

周邊、腦血管擴張，老人痴呆之輔助治療。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日服用3次，與食物或牛奶一起服用，以免反胃。

### 【注意事項】

- 1、此藥在發揮完全的效用時，通常需要幾星期的時間，感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、若您患有精神方面的疾病，請告訴醫生。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃；嘔吐；沒有胃口；流鼻水或鼻塞；頭昏；臉潮紅。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
發癢；紅疹；視線模糊；呼吸困難。	請立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】


當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)