

Diltiazem 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Herbesser 合必爽 錠	Diltiazem	30 mg/tab
Nakasser SR 能得爽 緩釋	Diltiazem	120 mg/cap

【作用】

輕度至中度之本態性高血壓、狹心症。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、達爾能為持續釋放劑型，每日服用 1 次，需整顆吞服，不可咀嚼、敲碎或剝半。
- 3、合必爽每日服用 3~4 次。

【注意事項】

- 1、開始治療時醫師可能給低劑量，之後再慢慢增量。
- 2、此藥會控制您的病情，但並不會治癒。感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥。
- 3、服用本藥前，如有懷孕或準備懷孕、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 4、患者如果有心臟、腎或肝臟方面的疾病，請告知醫師。
- 5、您的醫生可能會交代低鈉(少鹽)高鉀的飲食計劃療程，請遵照醫師或營養師的指示確實執行，並注意您的飲食。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈或頭昏；臉潮紅；頭疼；異常疲倦；心跳緩慢；反胃；沒有胃口；嘔吐；腹瀉；便秘；胃痛；口乾；難以入睡或清醒。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
身體局部腫脹；呼吸或吞嚥困難；昏倒；紅疹；皮膚或眼睛泛黃；發燒；增加心絞痛的頻率或嚴重性。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)