

## Kascoal 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Kascoal 加斯克兒錠	Dimethylpolysiloxane	40mg/tab

### 【作用】

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

### 【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用，不可自行停藥或增減藥量。
- 2、每日使用三至四次。

### 【注意事項】

1. 服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
2. 服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物。
3. 如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。如果服藥期間懷孕，也請立即告知醫師。
4. 請勿自行將藥拿給別人吃，以免發生意外。
5. 服藥期間避免食用產氣食物及含氣體飲料。

### 【可能出現的副作用】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
反胃、噁心、嘔吐、腹瀉等。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師

### 【忘了服藥怎麼辦？】

1. 想起時立即服用。
2. 若已經接近或已到下次服藥時間，只須服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍劑量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院  
諮詢專線：  
05-6335410 (白天)  
05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)