

Dipyridamole 用藥指導

【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量	藥品外觀
Dipyridamole 待匹力 達糖衣錠	Dipyridamole	25 mg/sct	橘紅色 圓凸形，有 STD/129 標示

【作用】

冠狀血管擴張、改善血小板功能、蛋白尿。

【用法和用量】

- 1、請遵照醫師指示服用。
- 2、每日服用 4 次。

【注意事項】

- 1、感覺症狀改善後仍要繼續服藥，未經醫師指示前勿擅自停藥或增減藥量。
- 2、服用本藥前，如有懷孕或有其打算、哺乳、開刀(包括牙齒)、服用其他藥物或對藥物過敏，應告訴醫師，以改變用量或監測副作用。
- 3、如果您曾患有低血壓，請告訴您的醫生。

【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
頭暈；胃痛；頭疼；紅疹；腹瀉；嘔吐；臉潮紅；發癢。	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
異常的出血或瘀血；皮膚或眼睛泛黃；胸痛。	請立即就醫

【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。