

## Arezil 用藥指導

### 【藥品資料】

商品名 / 中文名	主成份	含量
Arezil ODT 好思佳 口腔崩散錠	Donepezil Hcl	5 mg/tab

### 【作用】

治療阿茲海默氏症（失智）。

### 【用法和用量】

成人每日 5 mg，晚飯後或睡前。使用 4~6 週後，可依醫囑調整劑量至每日最大劑量 10 mg。若造成失眠，請白天服用。

### 【注意事項】

- 1、有消化性潰瘍或正在服用 NSAIDs 者，請留意消化系統的副作用。
- 2、有錐體外徑路障礙、氣喘或 COPD、心臟傳導障礙者，應小心使用。
- 3、本藥會於口腔中崩散，因本品不經口腔黏膜吸收，請以唾液或水吞服。  
勿於平躺狀態時，無水伴服
- 4、孕婦或可能懷孕的婦人，若評估治療效益高於胎兒的危險才能使用。
- 5、儘可能避免哺乳。
- 6、本品可幫助控制症狀但無法治癒，感覺較好後應繼續服藥，不應擅自停藥。
- 7、將藥放在舌頭上，此藥會很快會溶解，可隨唾液或白開水吞下。

### 【不良反應】

服藥後副作用不常發生，但有些人可能偶有

症 狀	如何處理
噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、減肥、尿頻、肌肉痙攣、關節疼痛，腫脹，或僵硬、疼痛、過度勞累、嗜睡、頭痛、頭暈、神經質、抑鬱症、混亂、行為變化、異常的夢想、難以入睡或保持睡眠、變色或瘀傷的皮膚、紅色，脫屑，皮膚瘙癢	如果這些症狀嚴重或一直持續，請告訴醫師
昏厥、心跳緩慢、胸痛、黑色或柏油樣大便、紅色便血、吐血、嘔吐物看起來像咖啡渣、無法控制排尿、排尿困難或排尿時疼痛、下背部疼痛、發燒、發作。	請停藥，並立即就醫

### 【忘了服藥怎麼辦？】

當您想起時，儘快補服，如果接近下次服藥時間，跳過一次，不要補服。不要服用加倍藥量。

### 【藥品如何保存】

請保存於緊密容器內，放在室溫、乾燥處，不必冷藏或冷凍。

---

若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。



天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院

諮詢專線：

05-6335410 (白天)

05-6337333 轉 2102 (例假日及晚上)